

UKŁAD MOCZOWY

KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I
KARDIOLOGII WUM

OBJAWY PODMIOTOWE

- BÓL
- TEMPERATURA
- ZABURZENIA W ODDAWANIU MOCZU
- DOLEGLIWOŚCI ZE STRONY NARZĄDÓW PŁCIOWYCH

BÓL

umiejscowienie, charakter bólu, promieniowanie,
czynniki wywołujące, czynniki zmniejszające ból

Bóle pochodzenia nerkowego spowodowane są napinaniem się torebki nerki lub chorobami obejmującymi miedniczkę nerkową (mięśń nerki nie boli)

BÓLE W OKOLICY LĘDŹWIOWEJ

Ostre- ostre stany zapalne nerek (odmiedniczkowe, kłębkowe z.nerek)

Bóle kolkowe (ostre rozdęcie miedniczki nerkowej w następstwie niedrożności moczowodu- kamień, skrzep krwi).

Napad kolki nerkowej: ból typowo umiejscowiony w okolicy lędźwiowej często promieniujący do pachwiny i okolicy narządów płciowych (może promieniować do podżebrza). Chory pobudzony, dodatni objaw Goldflama, temperatura.

Tępe -kamienie odlewowe nerki, wodonercze, roponercze, torbielowatość nerek, guzy nerek (rzadko, gdy guz jest duży), gruźlica.

Przewlekłe choroby miąższu nerek przebiegają z reguły bezobjawowo.

Inne: choroby kręgosłupa -zmiany zwyrodnieniowo-dyskopatyczne, tbc, meta choroby narządu rodnego -zapalenie przydatków, mięśniaki macicy, rak, zaburzenia miesiączkowania

BÓLE W OKOLICY SPOJENIA ŁONOWEGO

ostre zapalenie pęcherza moczowego

inne: zapalenie gruczołu krokowego, choroby jelita grubego,
choroby narządów rodnych

Ból w cewce moczowej podczas oddawania moczu jest najczęściej objawem jej zapalenia

TEMPERATURA

Gorączka -(temperatura ciała powyżej 38 st.C) najczęściej występuje w ostrych stanach zapalnych układu moczowo-płciowego

Stany podgorączkowe lub brak wzrostu temperatury towarzyszą chorobom przewlekłym układu moczowo-płciowego, gruźlicy, chorobom nowotworowym

ZABURZENIA W ODDAWANIU MOCZU

DYSURIA - trudności w oddawaniu moczu (oddawanie moczu bolesne lub bezbolesne, kroplami, słabym lub przerywanym strumieniem, może temu towarzyszyć

stranguria - uczucie palenia w cewce moczowej lub

pollakisuria - częste lub ciągłe parcie na mocz

ZABURZENIA ILOŚCI WYDLANEGO MOCZU

Skąpomocz - **oliguria** - wydalanie < 500 ml moczu na dobę

Bezmocz - **anuria** - wydalanie < 100 ml moczu na dobę

przyczyny: ostra niewydolność nerek (przednerkowa, nerkowa, zanerkowa) lub przewlekłe choroby miąższu nerek w fazie schyłkowej

ZABURZENIA ILOŚCI WYDALANEGO MOCZU cd

Wielomocz - **poliuria** - wydalanie > 2000 ml (3000ml) moczu na dobę

Przyczyny:

ostra lub przewlekła niewydolności nerek w fazie wielomoczu

moczówka prosta pochodzenia podwzgórzowo- przysadkowego (niedobór

wazopresyny) , nerkowego (niewrażliwość cewek nerkowych na wazopresynę

cukrzyca (diureza osmotyczna)

hiperkalcemia, hipokalemia

leki diuretyczne

endokrynopatie (nadczynność tarczycy)

zaburzenia rytmu -częstoskurcz

polidypsja psychogenna

ZABURZENIA W ODDAWANIU MOCZU CD

Nykturia - oddawanie moczu w nocy (> 1 raz)

przyczyny: zapalenie dróg moczowych, przerost gruczołu krokowego, nietrzymanie moczu, leki (diuretyki)

niewydolność serca, cukrzyca

nadmierne spożycie płynów przed snem

Mimowolne moczenie nocne (enuresis nocturna), fizj. do 3 rż
po 3 rż objaw chorobowy: wady rozwojowe dróg moczowych,
choroby rdzenia kręgowego, przewlekła niewydolność nerek, tło
psychogenne